

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO:

NOMBRE: COZIBOR® LÍQUIDO

CLASE DE PRODUCTO: FERTILIZANTE INORGÁNICO
PARA APLICACIÓN FOLIAR

TIPO DE FORMULACIÓN: CONCENTRADO SOLUBLE

REGISTRO DE VENTA I.C.A. No.: 10495



2. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Azufre soluble en agua (S).....20,0 g/l

Boro soluble en agua (B)*.....100,0 g/l

Cobre soluble en agua (Cu)**.....5,0 g/l

Molibdeno soluble en agua (Mo).....0,5 g/l

Silicio total (SiO₂).....5,84 g/l

Zinc soluble en agua (Zn)**.....30,0 g/l

*Complejado con etanolaminas

**Quelatados con E.D.T.A. y ácidos carboxílicos



Presentación:
250 ml - 1 l - 4 l - 20 l - 200 l

3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

ESTADO FÍSICO: Líquido, concentrado soluble

COLOR: Café

OLOR: Característico

pH EN SOLUCIÓN AL10%: 6,32 aproximadamente

DENSIDAD A 20 °C: 1,30 g/ml aproximadamente

Elaboró:

Dir. Soporte Técnico

Revisó:

Director Técnico

Aprobó:

Gerente General

Fecha:

2019-04-01

4. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

COZIBOR® LÍQUIDO es un complemento nutricional que provee elementos secundarios (azufre), y menores (boro, cobre, molibdeno, silicio y zinc), elementos fundamentales para las etapas de floración y producción. Presenta una rápida asimilación y transporte por la condición complejada y quelatada de sus elementos; da firmeza a la pared celular y contribuye a la acumulación de carbohidratos en órganos productivos de la planta. Además evita la deformación de tubérculos y aumenta la calidad y consistencia de los frutos, favoreciendo la postcosecha.

5. RECOMENDACIONES DE USO:

Se recomienda su aplicación por prescripción de un Ingeniero Agrónomo, con base en análisis de suelos y/o de tejido foliar.

AGUACATE: Dosis de 400 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por caneca de 200 litros de agua. Dos aplicaciones en plena floración, cuando la planta demanda mayor cantidad de boro.

ARROZ: Dosis de 500 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por hectárea; dos aplicaciones distribuidas en las etapas de máximo macollamiento e inicio de panícula.

CEBOLLA: 1,25 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por litro de agua, en formación y llenado del bulbo, 45 y 60 días después del trasplante.

LULO: 500 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por hectárea. Inicio de floración y llenado de fruto.

MAÍZ: 500 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por hectárea, entre los 20 y 30 días de germinado.

PAPA: 1,25 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por litro de agua, 250 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por 200 litros de agua. Dos aplicaciones, en el aporque y en el inicio de la floración.

TOMATE: 750 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por hectárea, 250 a 330 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por 200 litros de agua. Aplicar con primer racimo floral cuajado; si es necesario repetir a los 12 días.

ZANAHORIA: 1,5 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por litro de agua, 600 ml de **COZIBOR® LÍQUIDO** por hectárea. Un máximo de 6 aplicaciones por ciclo para evitar cuarteamiento y aumentar la producción.

Elaboró:

Dir. Soporte Técnico

Revisó:

Director Técnico

Aprobó:

Gerente General

Fecha:

2019-04-01

6. MÉTODO DE APLICACIÓN:

COZIBOR LÍQUIDO® es un producto de aplicación foliar para ser disuelto en agua, puede ser aplicado con los equipos convencionales.

Se recomienda realizar un cubrimiento total del follaje para obtener mayor asimilación del producto.

7. COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

COZIBOR LÍQUIDO® es compatible con la mayoría de los productos agrícolas para aplicación foliar. Se sugiere hacer una prueba rápida de compatibilidad antes de realizar mezclas.

Este producto no es fitotóxico cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso.



Elaboró:

Dir. Soporte Técnico

Revisó:

Director Técnico

Aprobó:

Gerente General

Fecha:

2019-04-01

Elaboró:

Dir. Soporte Técnico

Revisó:

Director Técnico

Aprobó:

Gerente General

Fecha:

2019-04-01